

PRODUCENT
BAYER S.A.S.
16, Rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09, Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
BAYER Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel.: 022 572 36 61

Załącznik nr 1 do pozwolenia nr 3978/10

MAXFORCE PRIME

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3978/10 z dnia 29.03.2010



UWAGA

DO STOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALNE EKIPY DDD

SUBSTANCJA CZYNNNA	IMIDACHLOPRYD – 21,50 g/kg 1(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoamina oraz atrakcyjne dla karaczanów dodatki smakowe.
ZAWIERA	1,2-Benzoizotiazolin-3-on 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
POSTAĆ PRODUKTU	ŻEL OWADOBÓJCZY (RB-gotowy do użycia)
ZASTOSOWANIE	ZWALCZANIE KARACZANÓW PRUSAKI: <i>Blattella germanica</i> , <i>Supella longipalpa</i> KARACZANY: <i>Blatta orientalis</i> (karaczan wschodni), <i>Periplaneta americana</i> (przybyszka amerykańska). Maxforce Prime zawiera szczególnie aktywne składniki odżywcze oraz elementy koloidalne, stanowiące źródło wody dla owadów. Specjalna konsystencja żelu pozwala na łatwe przyleganie do wszystkich powierzchni. Maxforce Prime charakteryzuje się dużą skutecznością w walce z karaczanami w ich różnych stadiach rozwoju.

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

SPOSÓB STOSOWANIA

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PREPARATU.

- Ustalić miejsce zastosowania żelu oraz miejsca skupisk i wędrówek karaczanów.
- Nałożyć Maxforce Prime w pobliżu ustalonych miejsc oraz wśród źródeł pożywienia i skupisk owadów.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wymiarów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Miejsca, w których kryją się karaluchy, są zazwyczaj miejscami ciemnymi i wilgotnymi (szczeliny, pęknięcia, materiały elektryczne umieszczone przy ścianie, zlewy, przewody wentylacyjne, itp.). Miejsca wędrówek to najczęściej listwy przyścienne, przewody, osłony elektryczne, kratki wentylacyjne, itp.). Karaluchy dostają się do mieszkania poprzez dostęp do przewodów kanalizacyjnych i technicznych. Przynęty umieszczone w tych miejscach zwiększają powodzenie działania.

- Należy wprowadzić Maxforce Prime do określonych miejsc: szczeliny, pęknięcia, listwy umieszczając tam niewielką ilość produktu.
- Nie wyklądać produktu w miejscach bez osłony lub na odkrytych powierzchniach.
- Kontrolować miejsca, w których umieszczono żel i w razie konieczności - ponowić aplikację w miejscach, gdzie go ubyło.
- Należy ponownie wyłożyć żel w miejscach całkowitego zużycia, ponieważ karaluchy pozostawiają wydzieliny i odchody by przyciągnąć inne osobniki.
- Żel może być stosowany miejscowo i w odstępach czasu, bez przerywania działalności w pomieszczeniu poddanemu dezynsekcji.
- Nie stosować żelu w pobliżu nie osłoniętych produktów żywnościowych.
- Przed zastosowaniem usunąć z zainfekowanej strefy wszelkie źródła naturalnego pożywienia dla karaczanów (odpady, resztki żywności, etc.) Przynęty są wówczas bardziej atrakcyjne, a środek chętniej spożywany.
- Żel wyklądać punktowo, bezpośrednio na powierzchniach poddawanych dezynsekcji. W miejscach osłoniętych i mało oświetlonych. Unikać miejsc zbyt wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych warstwą tłuszczu.
- Maxforce Prime w pierwszej kolejności powinien być wykładany w narożnikach, szczelinach, na wklęsłych i dziurawych powierzchniach oraz na kanalizacji lub nieogrzewanych przewodach, w pobliżu urządzeń gospodarstwa domowego, lodówek, kuchenek, zlewów, wanien, itp.
- Maxforce Prime bardzo dobrze nadaje się do stosowania w tzw. obiektach wrażliwych (restauracje, szpitale, szkoły, przedszkola, itp.) i niektórych szczególnych miejscach (w pobliżu urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub mechanicznych), gdzie stosowanie środków owadobójczych w płynie nie jest wskazane.
- Nie stosować na powierzchniach ciepłych lub podgrzewanych (>50°C).

Maxforce Prime nie powinien być zanieczyszczany innymi środkami owadobójczymi lub umieszczany na powierzchniach, gdzie niedawno przeprowadzono dezynsekcję.

DAWKOWANIE

GATUNKI	Dawka g/m ²
Karaczany Prusaki i <i>Supella longipalpa</i>	0,1-0,2
Karaczany wschodnie i amerykańskie	0,2-0,3

W badaniach otrzymano 100% skuteczność preparatu po 10 dniach w stosunku do samców karaczanów, a po 14 dniach w stosunku do samic i stadiów larwalnych karaczanów. Ponad 50% redukcję zaobserwowano już pierwszego dnia po zastosowaniu preparatu MAXFORCE PRIME.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

- Nie stosować na powierzchniach delikatnych, takich jak: wykładziny, obicia, marmur, ponieważ istnieje ryzyko niewielkiego odbarwienia).
- Nie stosować żelu na powierzchniach, na których są przechowywane, przygotowywane lub spożywane produkty spożywcze.
- W trakcie stosowania żelu, żywność i naczynia kuchenne powinny być chronione przed zanieczyszczeniem.
- Żel wyklądać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Nie stosować żelu w miejscach, gdzie regularne czyszczenie może spowodować przemieszczenie przynęty na powierzchnie stykające się z produktami żywnościowymi.
- Żel nie powinien być wykładany na powierzchniach regularnie czyszczonych przy użyciu wody, ponieważ mycie powierzchni może spowodować jego usunięcie.
- Nie stosować żelu w miejscach, na których niedawno rozpylono środek owadobójczy.
- Nie rozpylać środka owadobójczego na wyłożony żel.
- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice ochronne.
- W przypadku zanieczyszczenia preparatem skóry lub oczu miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
- Preparat przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.
- Po użyciu Maxforce Prime, a przed posiłkiem, należy dokładnie umyć ręce i skórę wodą z mydłem.

Produkt szkodliwy jest dla ryb. Nie zanieczyszczać produktem lub jego wkładami stawów, cieków i ujęć wodnych, rowów, itp.

OBJAWY ZATRUCIA

Brak – stosować leczenie objawowe.

Wymagane monitorowanie funkcji oddechowych i krążenia.

PIERWSZA POMOC

PORADY OGÓLNE

Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej ustalonej).

Natychmiast zdjęć zanieczyszczone ubranie i usunąć w bezpieczny sposób.

W PRZYPADKU KONTAKTU PRZEZ SKÓRĘ

Dokładnie zmyć dużą ilością wody i mydła, jeżeli jest możliwe z polietylenoglykolem 400, a następnie spłukać wodą.

Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej

przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować

płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA

Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny. Wypłukać usta. Wywołać wymioty tylko jeśli: 1.

poszkodowany jest całkowicie przytomny, 2.brak dostępu do pomocy medycznej, 3. w przypadku połknięcia

znaczących ilości (więcej niż jeden łyk) oraz 4.jeśli od połknięcia upłynęła nie więcej niż 1 godzina. (Uważać aby

zwrócona treść pokarmowa nie przedostała się do dróg oddechowych).

Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na oznakowaniu opakowania nie powoduje powstawania pośrednich i bezpośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka.

ANTIDOTUM

BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

- Wymagane monitorowanie funkcji oddechowych i krążenia.

- Płukanie żołądka.

- Podać węgiel (węgiel leczniczy) oraz siarczan sodu.

- W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE

Gdańsk 058 349 28 31

Kraków 012 411 99 99

Warszawa 022 619 66 54

Poznań 061 847 69 46

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w:

- oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;

- w suchym i chłodnym, pomieszczeniu wyposażonym w wentylację ogólną;

- w temperaturze od 0 do 30°C;

- w miejscach dostępnych tylko dla osób upoważnionych;

- z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt

W tych warunkach środek Maxforce Prime może być przechowywany przez 2 lata

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

PRODUKT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli to konieczne, po konsultacji z podmiotem zarządzającym i lokalnymi władzami, produkt można oddać na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów.

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

OPAKOWANIA

Opakowania niecałkowicie opróżnione powinny zostać usunięte jak odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie oczyszczone.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

DATA PRODUKCJI
DATA WAŻNOŚCI
POJEMNOŚĆ
NR SERII

2 LATA OD DATY PRODUKCJI

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Luczak

2016 -11- 07