

Posiadacz zezwolenia: Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw,
ul. Mełgiewska 104, 20-234 Lublin, Rzeczpospolita Polska, tel.: 0693 395 368.

**Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

Z A T O 5 0 W G

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zezwolenia MRiRW nr R - 1/PE z dnia 09.07.2013 r.

I STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

***Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.***

1. Agrest.

Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po zbiorach owoców, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

2. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała.

Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczek, rdza wejmutkowo-porzeczkowa.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby lub po zbiorach owoców, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

UWAGA:

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej

i które zwróciły się o taką informację.

II ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA, DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała - 14 dni.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

nie dotyczy.

W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin Zato 50 WG do zwalczania *amerykańskiego mączniaka agrestu, opadziny liści* w uprawie agrestu oraz *amerykańskiego mączniaka agrestu, opadziny liści porzeczek i rdzy wejmutkowo- porzeczkowej* w uprawie porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej odnoszą się zapisy zawarte etykiecie środka ochrony roślin Zato 50 WG stanowiącej załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 99/2013 z dnia 20.06.2013 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Zato 50 WG.